

Information om de vanligaste drogerna



PARTILLE KOMMUN

Partille alkohol- och narkotikamottagning

Kokainpåverkan

Kroppsliga tecken

En kokainpåverkad person kan visa följande kroppsliga tecken:

- vidgade pupiller
- hög puls
- höjt blodtryck
- hastig, ytlig andning (kan bli mycket ytlig vid överdoser)
- nästäppa eller rinnande näsa
- rastlöst uppträdande
- rivande och skrapande av huden för att få bort inbillade kryp

Övrigt

Vid längre tids kokainmissbruk kan missbrukarna bli kraftigt avmagrade och uppvisa kraftiga riv- och skrapmärken (sår) av försöken att bli kvitt inbillade kryp under huden. Kokainpåverkan har stora likheter med påverkan av syntetiska centralstimulantia men har hastigare förlopp (ruset avklingar snabbare). Risken för akuta dödsfall på grund av överdoser är större vid kokainpåverkan.

Centralstimulantiapåverkan

Kroppsliga tecken

En centralstimulantiapåverkad person kan visa följande kroppsliga tecken under ruset:

- kraftigt vidgade pupiller
- hastig, ofta oregelbunden puls
- förhöjd kroppstemperatur och svettningar
- muntorrhet, ofta med ljudligt smackande för att öka salivomsättningen
- kramper och epileptiska anfall (vid höga doser)
- darrningar eller muskelryckningar, med bland annat störd ansiktsmimik och klumpig finmotorik
- stereotypa (stelt uppreade) beteenden, till exempel planlös städningsaktivitet (så kallad städnoja)
- rastlöshet med svårigheter att sitta stilla

Psykiska tecken

En kokainpåverkad person kan visa följande psykiska tecken:

- upprymdhet
- flyktig tankeverksamhet (verkar "speedad", närmast manisk)
- osammanhängande tal
- försämrad koordinationsförmåga
- hallucinationer (synvillor, hörselvillor och känselvillor)
- förvirring, förföljelsemani och aggressivitet

Psykiska tecken

En centralstimulantiapåverkad person kan visa följande psykiska tecken under ruset:

- "nervighet"
- retlighet
- tankeflykt med osammanhängande tal (verkar "speedad" eller manisk)
- oro och ångest
- förvirring (i svårare fall paranoida psykos)

Övrigt

Vid långvarigt missbruk av syntetiska centralstimulantia kan följande tydliga skador eller störningar förekomma:

- kraftig avmagering
- ryckighet i motoriken (även vid drogfrihet)
- karies, tandlossning och spräckta tänder.

Cannabispåverkan

Kroppsliga tecken

En cannabispåverkad person kan visa följande kroppsliga tecken under ruset:

- stora, utvidgade pupiller
- blodsprängda ögon (röda ögonvitor, "konjunktivit")
- hängande ögonlock
- hastig puls, höjt blodtryck
- muntorrhet
- illamående med uppkastningar

Övrigt

Cannabisrökare kan efter lång tids missbruk uppvisa bestående störningar som:

- långdragen trötthet ("seghet")
- bristande intresse för omvärlden
- misskött hygien
- förvrängd logik
- genomgripande personlighetsförändringar

Opiatpåverkan

Kroppsliga tecken

En opiatpåverkad person kan visa följande kroppsliga tecken

- sammandragna eller små pupiller ("som nålhuvuden"), starrande blick
- hängande ögonlock
- svårigheter att stå på benen (kraftig hopsjunkenhet)
- illamående och kräkningar
- långsam puls och sänkt blodtryck
- långsam andning, vid överdoser: livshotande andningsförlamning

Psykiska tecken

En cannabispåverkad person kan visa följande psykiska tecken:

- problem att hålla samman tankar ("tappar tråden")
- minnesstörningar
- svårigheter att uppskatta tidsintervall
- upprymdhet med fnittrighet
- förvirring, i svårare fall oro eller desorientering och aggressivitet

Psykiska tecken

En opiatpåverkad person kan visa följande psykiska tecken:

- likgiltighet eller sömnighet, vid kraftig påverkan medvetslöshet
- sludrande tal
- kontaktsvårigheter
- nedsättning av smärtekänsligheten

Ecstasypåverkan

Kroppsliga tecken

En ecstasypåverkad person kan visa följande kroppsliga tecken:

- stora pupiller med långsam pupillreaktion
- ökad puls
- förhöjd kroppstemperatur
- hyperaktivitet
- kräkningar
- vid stora doser eller samtidigt kroppsansträngning akuta förgiftningar med värmeslag, cirkulationskollaps och hjärtarytmier (oregelbunden hjärtverksamhet)

Övrigt

Ecstasymissbrukare kan efter en tids upprepat drogintag bli emotionellt "utbrända" (få en "zombieliknande" reaktion), bli sexuellt ointresserade och drabbas av bland annat svåra depressioner.

Psykiska tecken

En ecstasypåverkad person kan visa följande psykiska tecken:

- emotionell öppenhet med välvilja mot alla människor, gränsande till "kletighet"
- sexuellt intresse
- ångest- och panikkänslor
- förvirring med hallucinationer
- psykos

Hallucinogenpåverkan

Kroppsliga tecken

En missbrukare som är påverkad av meskalin, psilocybin, LSD eller liknande hallucinogener kan visa följande kroppsliga tecken:

- stora pupiller men normal ljusreaktion
- hög puls
- förhöjt blodtryck
- darrningar
- illamående
- kallfrossa
- kramper
- nedsatt koordinationsförmåga
- hastig (ibland ytlig) andning

Övrigt

Många hallucinogener har i renframställd form rusverkningar som är svåra att skilja från varandra. Det gäller bland annat meskalin, psilocybin och LSD. Ytterligare information om till exempel drogens utseende och intagningsätt eller från biokemisk analys krävs i allmänhet för att kunna särskilja drogerna.

Psykiska tecken

En hallucinogenpåverkad person kan visa följande psykiska tecken:

- ångest
- snabba stämningsförskjutningar
- förvirring
- schizofreniliknande psykoser

GHB-påverkan

Kroppsliga tecken

En GHB-påverkad person kan visa följande kroppsliga tecken:

- avkoppling eller slöhet
- muskelslapphet
- muskelkramper (vid högre doser)
- ökad känslighet för beröring
- vid höga doser: långsam och djupare andning – i svårare fall andningsstillstånd, sänkt puls, kräkningar och medvetslöshet

Psykiska tecken

En GHB-påverkad person kan visa följande psykiska tecken på påverkan:

- lugn och välbefinnande
- eufori
- dåsighet, vid höga doser sömnighet
- minskade hämningar med till exempel fritttrighet
- pratighet med vid högre doser osammanhängande tal
- ökad sexuell retbarhet (särskilt hos män)

Övrigt

GHB-rus följs ofta av sömn under några timmar med ett hastigt uppvaknande. Efter sömnen kan missbrukaren ha stora svårigheter att minnas vad som hände före och under ruset.

